

ממצאים חדשים בטיפול במיגרנה

מיגרנה כגורם סיכון לשבץ
דר' אמנון מוסק

השכיחות הגבוהה של מיגרנה בין צעירים שסבלו משבץ והשינויים בתפקוד כלי הדם
במוח בזמן התקף מיגרנה מצביעים על האפשרות שמיגרנה מהווה גורם סיכון לשבץ.
ממצאים אפידמיולוגים חדשים תומכים בבירור שמיגרנה מהווה גורם סיכון לשבץ, לפחות
בכמה תת-אוכלוסיות. ההתקדמות בשיטות ההדמיה של המוח סיפקה ממצאים נוספים
שמיגרנה לא רק קשורה לשבץ אלא גם לאוטמים מוחיים תת-קלינים ולשינויים בחומר הלבן
במוח. ממצאים אלו היו שכיחים יותר בנשים עם מיגרנה עם אורה והיו קשורים לחומרת
ההתקפים ותדירות ההתקפים. המנגנון בו מתרחשים השינויים במוח בחולי מיגרנה אינו ידוע
כשקיומו של קשר אפשרי בין מיגרנה עם patent foramen ovale הועלה לאחרונה.
בעוד שמשמעותם הקלינית של ממצאים אלו עדיין לא ברורה, נראה שנדרשת התיחסות
מיוחדת לחולת מיגרנה עם אורה במיוחד אצל אלו שיש גורמי סכון וסקולרים נוספים.
בהרצאה יוצגו הממצאים שתוארו, יועלו מנגנונים פתופיזיולוגים אפשריים והגישה
הטיפולית לחולים אלו.